



This form is for people who have a moderately to severely weakened immune system who have already received 2 doses of Pfizer or Moderna COVID-19 vaccine.

If you meet the [criteria](#) outlined by the CDC, it is recommended that you get a 3rd dose of an mRNA (Pfizer or Moderna) vaccine at least 28 days after your 2nd dose of vaccine. When possible, you should receive the same vaccine. For example, if you got a series of Pfizer vaccine, try to get a Pfizer vaccine for your 3rd dose. Talk to your doctor about the need to get a 3rd dose of COVID-19 vaccine and the best timing of a 3rd dose.

I attest that I am immunocompromised and am eligible for a third dose of vaccine based on the criteria below.

- Receiving active cancer treatment for tumors or cancers of the blood;
- Received an organ transplant and am taking medicine to suppress my immune system;
- Received a stem cell transplant within the last 2 years or am taking medicine to suppress the immune system;
- Moderate or severe primary immunodeficiency (such as DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome);
- Advanced or untreated HIV infection;
- Active treatment with high-dose corticosteroids or other drugs that suppress my immune response

Signature: _____

Name: _____

Date: _____

It is important to continue to protect yourself after you get a 3rd dose of vaccine. This includes wearing a well-fitting mask, maintaining physical distance, avoiding crowded places or spaces with poor air flow, and washing hands often. Consider "[double masking](#)" (wearing a cloth face mask over surgical mask) or an N95 respirator for a higher level of protection.

For more information, see the [Moderna](#) or [Pfizer](#) Fact Sheets for Recipients and Caregivers and the CDC webpage [COVID-19 Vaccines for Moderately to Severely Immunocompromised People](#).

If you do not have access to a printer, you can write the attestation by hand.



Este formulario es para personas que tienen un sistema inmunológico de moderado a gravemente debilitado que ya han recibido 2 dosis de la vacuna Pfizer o Moderna contra el COVID-19.

Si cumple con los [requisitos](#) descritos por los CDC, se recomienda que reciba una tercera dosis de una vacuna de ARNm (Pfizer o Moderna) al menos 28 días después de su segunda dosis de vacuna. Cuando sea posible, debe recibir la misma vacuna. Por ejemplo, si recibió una serie de vacunas Pfizer, intente obtener una vacuna Pfizer para su tercera dosis. Hable con su médico sobre la necesidad de recibir una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y el mejor momento para una tercera dosis.

Yo declaro que estoy inmunodeprimido y soy elegible para una tercera dosis de vacuna según los requisitos a continuación.

- Recibió algún tratamiento oncológico para tumores o cánceres en la sangre;
- Recibió un trasplante de órgano y está tomando medicamentos inmunosupresores;
- Recibió un trasplante de células madre en los últimos 2 años o está tomando medicamentos inmunosupresores;
- Tiene inmunodeficiencia primaria moderada o grave (como el síndrome de DiGeorge, el síndrome de Wiskott-Aldrich);
- Tiene una infección avanzada o no tratada por el VIH;
- Está bajo un tratamiento activo con altas dosis de corticosteroides u otros medicamentos que pueden suprimir su respuesta inmunitaria

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: _____

Es importante que continúe protegiéndose después de recibir una tercera dosis de la vacuna. Esto incluye usar una mascarilla que le quede bien, mantener la distancia física, evitar lugares con mucha gente o espacios con poca circulación de aire y lavarse las manos con frecuencia. Considere la posibilidad de usar una "[mascarilla doble](#)" (usar una mascarilla de tela sobre la mascarilla quirúrgica) o un respirador N95 para un mayor nivel de protección.

Para obtener más información, consulte la hoja informativa de [Moderna](#) o [Pfizer](#) para receptores y cuidadores y la página web de los CDC, [Vacunas contra el COVID-19 para personas que están moderada o gravemente inmunodeprimidas](#)

Si no tiene acceso a una impresora, puede escribir la declaración a mano.